

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Татьяна

Возраст: 74

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.02.2010 22:16:00

формирования заключения врача: 01.03.2010 09:10:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/134379/answer/134380>



Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Вероятнее всего, у Вас имеет место [стрессовое недержание мочи](#), или как его еще называют недержание мочи при напряжении. Возраст не является причиной, он является предрасполагающим фактором, а причина - слабость мышц тазового дна. Для подтверждения этого диагноза нужен осмотр на кресле, выполнение КУДИ - комплексного уродинамического исследования. Если диагноз подтвердится, то в такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения малоэффективны. На сегодняшний день хорошо зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи является субуретральный слинг. Это ряд операций, смысл которых заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Это TVT, TOT, IVS и др. Такие операции выполняются практически в амбулаторных условиях (в разных клиниках по-разному). Мы готовы помочь Вам на базе (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(905)74-32-833. Удачи.