

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Роман

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.12.2005 02:58:05

**формирования заключения врача:** 27.12.2005 17:17:19

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/13658/answer/13659>



## Заключение врача

Уважаемый Роман! Гипоспадия – врожденная аномалия, которая характеризуется отсутствием задней стенки мочеиспускательного канала в дистальных отделах. При этом наружное отверстие находится на головке или на задней поверхности полового члена, в области мошонки или промежности. При гипоспадии отмечается несоответствие длины мочеиспускательного канала и пещеристых тел, искривление полового члена кзади. Чаще гипоспадия встречается у мужчин. При гипоспадии лечение оперативное, которое состоит из нескольких этапов (количество этапов зависит от вида и степени заболевания). Основная задача первого этапа – выпрямление полового члена. Это обеспечивает нормальные условия для его роста, развития пещеристых тел и создает благоприятные условия для последующей пластики уретры (второй этап оперативного лечения). Необходимость операции определяет врач уролог после тщательного осмотра и обследования. В любом случае, Вам надо обязательно обратиться к квалифицированному урологу для непосредственного осмотра. Операцию лучше провести в крупном урологическом центре (например, в Ростове-на-Дону, где есть большой опыт проведения таких операций). Пишите, если будут еще вопросы.