

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** оксана

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.12.2005 18:46:55

**формирования заключения врача:** 28.12.2005 18:46:44

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/13670/answer/13671>



## Заключение врача

Уважаемая Оксана! Ситуация сложная, но постараемся разобраться. Насколько я понимаю, у Вашего мужа была обнаружена урогенитальная инфекция (хламидии, уреаплазмы), у Вас все анализы отрицательные. Но, поскольку эта инфекция передается половым путем, то лечение назначается в обязательном порядке обоим половым партнерам одновременно, половая жизнь на период лечения не рекомендуется. Получается, что Ваш муж пролечился, а Вы обратились к гинекологу и остались без лечения. Поэтому, я считаю, Вам обоим (!) необходимо начинать с повторного курса лечения урогенитальной инфекции! Тем более, что у Вас есть все признаки воспалительного процесса - боли, дизурические явления, мутная с неприятным запахом моча, повышенное количество лейкоцитов в моче и т. д. Антибиотики, уросептики, иммуностимуляторы - основная схема лечения хламидиоза и микоплазмоза, инстилляции и физиопроцедуры - вспомогательные методы. Потом после купирования воспалительных явлений - Детрузитол и Кардура (по 2 мг на ночь) в течение 2-3 месяцев. Необходимо все-таки сдать мочу на микобактерии туберкулеза (это специальный посев), проконсультироваться у невролога (на предмет патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника). Пишите, если что, буду рада помочь, чем смогу.