

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** николай

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.01.2006 21:36:22

**формирования заключения врача:** 10.01.2006 20:16:09

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/13940/answer/13941>



## Заключение врача

Уважаемый Николай! Первичный шов уретры, выполненный в первые часы после травмы, конечно, дает лучшие результаты. Но это возможно только в случае достаточных знаний и опыта хирурга в этой области. В противном случае, при невозможности выполнить такую операцию сразу, поступают следующим образом: выполняют эпицистостомию, выжидают время (до нескольких месяцев) для ликвидации воспалительного процесса, формирования стриктуры уретры. Через несколько месяцев выполняют реконструктивную операцию на уретре. На нашем сайте размещена База Данных урологов, Вы можете найти уролога в Вашем регионе, который Вас проконсультирует по данному вопросу. Наилучшие результаты пластических операций на уретре получены в Ростовском Государственном Медицинском университете на кафедре урологии, зав. кафедрой урологии профессор Коган Михаил Иосифович (пер. Нахичеванский 29, РостГМУ, e-mail (Коган Михаил Иосифович): dept\_kogan@mail.ru, e-mail (Белоусов Игорь Иванович): belrost\_dept@mail.ru). Эта кафедра и её клиники очень серьезно занимаются проблемой восстановительной урологии, являются законодателями в этой области урологии. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. Предварительно обратитесь на их сайт UroProfi.ru. Пишите, если будет нужна помощь. С уважением.