

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 45

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.01.2006 12:46:09

формирования заключения врача: 11.01.2006 19:08:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/14008/answer/14009>



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Варикоцеле – варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 14-15 возраст. Варикоцеле – результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Лечение варикоцеле только оперативное, причем на возможно более ранней стадии, т. е. пока не наступили нарушения сперматогенеза. Вы совершенно правильно поступили, что прооперировались. Сейчас, чтобы узнать Вашу способность к оплодотворению, Вам необходимо сдать спермограмму. Если результаты будут нормальные, то у Вас дети будут. Удачи!