

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Екатерина

**Возраст:** 52

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.01.2006 21:24:03

**формирования заключения врача:** 12.01.2006 20:49:41

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/14026/answer/14027>



## Заключение врача

Уважаемая Екатерина! Для начала Вам необходимо исключить инфекцию мочевыводящих путей. Для этого надо сдать анализы на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы; общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Если обнаружится какая-либо инфекция, то надо пролечиться. При обнаружении урогенитальной инфекции, которая передается половым путем, лечение надо будет пройти Вам и Вашему половому партнеру. Если никаких инфекций не будет выявлено, то, возможно, имеет место гиперактивный мочевой пузырь. Пишите, если будут еще вопросы, буду рада помочь.