

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Оксана

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 23.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1406/answer/1407>



Заключение врача

Уважаемая Оксана! Вы совершенно правильно осведомлены о возможных рецидивах урогенитальной инфекции (а именно к такой инфекции и относятся хламидии и уреоплазмы), о возможном влиянии инфекции на развивающийся организм. Лечение урогенитальной инфекции у женщин занимаются не урологи, а гинекологи. В курс терапии включаются не только антибактериальные препараты, но и иммуностимулирующие, противовоспалительные, общеукрепляющие средства, витаминотерапия и т. д. Это комплексное лечение. Эубиотики (препараты, содержащие живые бактерии - для предупреждения развития дисбактериоза) применяют обязательно, с первого дня лечения и до 2-3 недель после отмены антибиотиков. Лучше использовать старые добрые препараты - бификол, бифидумбактерин. Лечение обязательно должны проходить все половые партнеры одновременно, причем рекомендуется воздерживаться от половой жизни во время лечения и до результата контрольного анализа (даже презерватив не дает 100% гарантии). Через 3 месяца после получения отрицательного результата, можно проводить мероприятия по зачатию. Удачи!