

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Оксана

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.12.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 23.12.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1406/answer/1407>



## Заключение врача

Уважаемая Оксана! Вы совершенно правильно осведомлены о возможных рецидивах урогенитальной инфекции (а именно к такой инфекции и относятся хламидии и уреоплазмы), о возможном влиянии инфекции на развивающийся организм. Лечение урогенитальной инфекции у женщин занимаются не урологи, а гинекологи. В курс терапии включаются не только антибактериальные препараты, но и иммуностимулирующие, противовоспалительные, общеукрепляющие средства, витаминотерапия и т. д. Это комплексное лечение. Эубиотики (препараты, содержащие живые бактерии - для предупреждения развития дисбактериоза) применяют обязательно, с первого дня лечения и до 2-3 недель после отмены антибиотиков. Лучше использовать старые добрые препараты - бификол, бифидумбактерин. Лечение обязательно должны проходить все половые партнеры одновременно, причем рекомендуется воздерживаться от половой жизни во время лечения и до результата контрольного анализа (даже презерватив не дает 100% гарантии). Через 3 месяца после получения отрицательного результата, можно проводить мероприятия по зачатию. Удачи!