

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Роман

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.04.2010 17:45:00

формирования заключения врача: 04.04.2010 20:11:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/140853/answer/140854>



Заключение врача

Уважаемый Роман!

1. "Быстро кончаю" - продлите первый половой контакт. Для этого есть разные простейшие способы и методы - метод стоп-старт, использование мазей, пролонгирующих (удлиняющих) половой акт, презервативов со специальной пролонгирующей смазкой.
2. После первого полового акта в норме существует период абсолютной рефрактерности, в течение которого эрекция невозможна или недостаточна, или сопровождается дискомфортом. И у каждого этот период индивидуальной продолжительности.
3. Если половая жизнь нерегулярная, то наличие комочков в сперме - норма. Если же половая жизнь (или мастурбация) регулярны, то тогда нужно убедиться в отсутствии воспаления. Для этого надо сдать спермограмму.

Удачи.