

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Роман

**Возраст:** 34

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.04.2010 17:45:00

**формирования заключения врача:** 04.04.2010 20:11:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/140853/answer/140854>



## Заключение врача

Уважаемый Роман!

1. "Быстро кончаю" - продлите первый половой контакт. Для этого есть разные простейшие способы и методы - метод стоп-старт, использование мазей, пролонгирующих (удлиняющих) половой акт, презервативов со специальной пролонгирующей смазкой.
2. После первого полового акта в норме существует период абсолютной рефрактерности, в течение которого эрекция невозможна или недостаточна, или сопровождается дискомфортом. И у каждого этот период индивидуальной продолжительности.
3. Если половая жизнь нерегулярная, то наличие комочков в сперме - норма. Если же половая жизнь (или мастурбация) регулярны, то тогда нужно убедиться в отсутствии воспаления. Для этого надо сдать спермограмму.

Удачи.