

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Наташа

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.12.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 25.12.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1444/answer/1445>



## Заключение врача

Уважаемая Наташа! Фимоз является аномалией развития наружных половых органов, в последнее время встречается часто. Фимоз – это сужение крайней плоти, препятствующее освобождению головки из препуциального мешка. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество – смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции – разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака. Выраженный фимоз у детей может вызвать затруднение мочеиспускания, задержку мочи, и даже явиться причиной расширения верхних мочевых путей. При выраженном фимозе показана операция - циркумцизио – иссечение крайней плоти. Осложнением фимоза является парафимоз – ущемление головки полового члена, который может привести к некрозу (омертвлению) головки полового члена. Если такое возникнет, то потребуются срочное хирургическое вмешательство. Необходимость в оперативном лечении фимоза определяет врач уролог, возраст значения не имеет. Удачи!