

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Egor

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.08.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 22.08.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/144/answer/145>



Заключение врача

Здравствуй Егор! Иногда происходят такие казусы, когда в лабораторных условиях микроб чувствителен к данному антибиотику, а в организме его чувствительность сильно изменяется, вплоть до полной. Жаль, что это произошло именно с Вашим ребенком. Антибиотик (аугментин) очень хороший, но не в Вашем случае. Антибиотики назначают по 5-7-10 дней, иногда до 14 дней, но редко. Попробуйте следующую схему лечения: иммунал (иммунный препарат) 5 капель 3 раза в день 20 дней; ципрофлоксацин (препарат из группы фторхинолонов, антибактериальное действие) - 50 мг 3 раза в день 7 дней, метронидазол (тоже антибактериальный препарат) 50 мг 3 раза в день 7 дней после еды, запивать большим количеством жидкости. Из побочных действий этих препаратов может быть тошнота, если будет сильно тошнить, будет рвота, то препараты надо отменить. Т. к. в лечении присутствуют два антибиотика, то необходимо защитить кишечник от дисбактериоза - линекс 1 капсуле 3 раза в день, бифидумбактерин, бификол (лучше линекс). Все-таки необходимо наблюдение урологаЮ, виртуально трудно лечить, особенно ребенка, необходим визуальный осмотр. Удачного выздоровления, будем рады помочь Вам.