

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 28

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.02.2006 11:21:15

формирования заключения врача: 12.02.2006 21:45:35

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/14954/answer/14955>



Заключение врача

Уважаемый Александр! Спасибо за поздравление и симпатичную открытку. Я согласна с Вашими врачами, что имеется двусторонний рефлюкс, следствием которого является гидронефроз обеих почек, больше справа. Это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи). Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая (1-2), иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях (1-2 степень) рефлюкс самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая (3), и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение – антирефлюксная операция. Пока необходимо соблюдать диету (исключить острое, соленое), давать ребенку отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца по 1 ст. л. 3 раза в день). Ваши врачи совершенно правы, рекомендуя дообследование девочки в условиях стационара. С уважением.