

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: станислав

Возраст: 44

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.07.2010 20:49:44

формирования заключения врача: 14.07.2010 21:22:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/150907/answer/150909>



Заключение врача

Больше двигаться, пить часто и по 200-300 мл(не менее 3х литров сутки), принимать таблетки "но-шпа" по 2т 3 раза в день. Грелку можно на поясницу(но не в коем случае не на живот!) При начинающемся приступе - внутримышечная инъекция баралгина(если есть рядом медработник). Если повысится температура и\или появится озноб - ехать в больницу срочно(в течение 1-2 часов). Ну и все эти советы можно применять, если есть твёрдая уверенность, что это, собственно, - почечная колика, а не , к примеру - аппендицит или другая острая хирургическая патология брюшной полости. Поэтому, прежде, чем изгонять камень из мочевых путей, неплохо сделать УЗИ почек и проконсультироваться у уролога или хирурга(хотя бы амбулаторно).