

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Элла

**Возраст:** 64

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.07.2010 12:44:53

**формирования заключения врача:** 22.07.2010 16:04:50

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/150711/answer/151558>



## Заключение врача

1. Уважаемая Элла, в первую очередь при таком быстром росте ПСА надо исключать наличие распространения процесса (метастазы в лимфоузлы, в кости). 2. При раке простаты стадии T3 HIFU может выполняться в качестве паллиативного лечение (спасительного лечения), и не может быть радикальным методом лечения рака простаты. Мы иногда прибегаем к этому виду лечения при такой стадии заболевания с целью отсрочить время назначения гормональной терапии, но при этом обязательно информируем наших пациентов о нерадикальности лечения. 3. К сожалению, я ничего не знаю о исходном состоянии заболевании Вашего отца и состоянии его организма и не могу сделать никаких выводов. 4. Где Вы делали HIFU рака простаты, на каком оборудовании? Удачи!