

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Марина

**Возраст:** 41

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.08.2010 11:33:24

**формирования заключения врача:** 05.08.2010 20:40:28

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/153198/answer/153339>



## Заключение врача

Правая почка наиболее подвержена изменениям при беременности (анатомическая особенность беременной матки - чаще отклоняется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки). Отвары в этой ситуации вряд ли помогут. Почку необходимо дренировать, т. е. восстановить нарушенный отток мочи из нее - установить либо внутренний мочеточниковый стент, либо пункционную нефростому справа. Иначе беременность может закончиться плачевно - на фоне нарушения уродинамики вспыхнет воспаление в правой почке, уросепсис, и т.д. а это уже угрожающее жизни состояние. Проконсультируйтесь в областной больнице.