

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александра

**Возраст:** 49

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.02.2006 20:56:05

**формирования заключения врача:** 01.03.2006 13:32:08

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/15456/answer/15457>



## Заключение врача

Уважаемая Александра! У каждого метода обследования есть своя разрешающая способность. УЗИ - это скрининговый метод обследования и его достоверность до 70%. Экскреторная урография применяется именно для уточнения результатов УЗИ. Сцинтиграфия еще более точный метод. То есть, Ваши врачи по нарастающей назначают наиболее точные обследования, их тактика абсолютно верна. Расширение лоханки у ребенка до 8-15 мм - это патология, которая требует внимания. Если лоханка становится меньше после микции (мочеиспускания), и расширяется при полном мочевом пузыре, то, вероятнее всего, рефлюкс (пусть и небольшой), имеет место. Пишите, если будут еще вопросы.