

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталья

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.03.2006 16:39:08

формирования заключения врача: 05.03.2006 22:18:24

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/15574/answer/15575>



Заключение врача

Уважаемая Наталья! По поводу прерывистого мочеиспускания малыша необходимо осмотреть очно. Вы правы, вероятнее всего, проблема не врожденная, а приобретенная. Внутривенная урография – один из самых информативных и один из самых доступных методов диагностики урологической патологии. Он заключается в том, что пациенту внутривенно вводят контрастный препарат, потом делается серия рентгеновских снимков на определенных минутах обследования. Таким методом выявляются врожденные аномалии развития (стриктуры, добавочные сосуды почек, перегибы мочеточников, удвоение почек и мочеточников, гидронефроз и т. д.), наличие камней, опухолей, т. е. выявляются причины патологии, уточняются результаты других методов исследований (УЗИ, например). В детской урологии обследование проводят под наркозом. Из осложнений может наблюдаться индивидуальная непереносимость контрастного препарата. Если Ваши врачи назначили Вашему ребенку экскреторную (внутривенную) урографию, то вероятно, для этого были веские причины. Доверьтесь своим врачам, тем более, что при дистопии и гипоплазии одной почки, расширении лоханки контрлатеральной почки это обследование необходимо. С уважением.