

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Мария

Возраст: 59

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.03.2006 16:49:13

формирования заключения врача: 16.03.2006 21:49:30

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/15844/answer/15845>



Заключение врача

Уважаемая Мария! Ваше состояние называется крипторхизм – задержка опускания яичек. Это наиболее часто встречаемый порок развития яичек. Крипторхизм чаще наблюдается справа. В возникновении крипторхизма определенную роль играют общие и местные факторы (различные механические препятствия – внутрибрюшинные сращения, фиброзные тяжи, узкое наружное и внутреннее паховые кольца, недоразвитие сосудистой ножки; дисфункция эндокринных желез матери и плода и т. д.). Многочисленными исследованиями доказано, что неопущенное яичко уменьшено в размерах, имеет более дряблую консистенцию. Эти изменения проявляются с 6 лет. Нарушение развития и функции неопустившегося яичка обусловлено неблагоприятным температурным режимом. При неопущении яичка в первую очередь страдает сперматогенный эпителий задержанного яичка, в результате чего при двустороннем процессе развивается бесплодие. В более тяжелых случаях имеется высокая возможность перерождения этого яичка в злокачественную опухоль. Крипторхизм бывает брюшной (абдоминальный), когда яичко задержано в брюшной полости, и паховый, когда яичко находится в паховом канале. Вам необходимо проконсультироваться у детского уролога по месту жительства для точной диагностики и назначения лечения. С уважением.