

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Жанна

Возраст: 55

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.09.2010 22:12:31

формирования заключения врача: 13.09.2010 21:14:15

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/158645/answer/158737>



Заключение врача

Ангиомиолипома – доброкачественная опухоль почки, которая чаще всего встречается у женщин. Ангиомиолипома представлена жировыми клетками, разрастаниями гладкомышечных клеток и извитыми сосудами. Эти элементы могут находиться в опухоли в разных соотношениях. Доброкачественные опухоли часто протекают абсолютно бессимптомно, и являются случайной находкой при проведении разного рода исследований. Для подтверждения диагноза необходимо иметь результаты следующих обследований: УЗИ, экскреторная урография и компьютерная томография. В неясных случаях – магнитно-резонансное и ангиографическое исследование (сосудов опухоли). Если по данным КТ (МРТ) в опухоли нет очагов малигнизации (озлокачествления), то прогноз достаточно благоприятный. Лечение этого вида опухолей остается дискуссионным. Большинство врачей считают, что при опухолях менее 3 см, имеющих медленный рост (0-5 мм за 2-5 лет) показано наблюдение с выполнением повторных обследований через 6-12 месяцев. При быстром росте – только оперативное лечение. Из малоинвазивных методов применяют эмболизацию сосудов, криотерапию, лапароскопическую резекцию почки.