

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Олег

**Возраст:** 45

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.03.2006 21:36:17

**формирования заключения врача:** 26.03.2006 16:01:55

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/16114/answer/16115>



## Заключение врача

Уважаемый Олег! Ваши врачи абсолютно правы в диагностике и тактике ведения. Если не делали, то обязательно необходимо выполнить посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам и посев с поверхности миндалин на флору чувствительность к антибиотикам. Это необходимо для назначения антибактериальных препаратов при обострении воспалительного процесса и высокой степени бактериурии в настоящее время. Миндалины, как постоянный источник инфекции, лучше удалить. В будущем, хотя это не факт, но возможно развитие хронической почечной недостаточности. Дальнейшую тактику Вашего наблюдения Вы должны определить с лечащим врачом, т. к. это отдельная тема, в которой невозможно предусмотреть все при однократной консультации. Основные направления - профилактика обострений пиелонефрита, своевременная диагностика экстренных состояний. На нашем сайте размещена База Данных урологов, Вы можете найти уролога в Вашем регионе, который Вас проконсультирует по данному вопросу. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. Удачи Вам!