

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Светлана

**Возраст:** 38

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.01.2009 15:05:00

**формирования заключения врача:** 05.01.2009 17:22:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/165479/answer/165480>



## Заключение врача

Здравствуйтесь, Светлана!

То, что Вы описываете - головчатая форма гипоспадии. При этой форме оперативное лечение показано только в том случае, если есть выраженное искривление полового члена. Наиболее оптимальный возраст для выполнения операции: 0,5 - 1,5 года, хотя делают и позже. Если операция показана и ее не делать, то в будущем возникает триада проблем: косметические, психологические и сексуальные. При головчатой форме проблем с репродуктивной функцией не возникает.

В любом случае, все эти вопросы решаются только при очной консультации.

Если такой возможности сейчас нет, сфотографируйте в разных проекциях половой член и перешлите мне на электронный адрес ([gkv@bk.ru](mailto:gkv@bk.ru)). Прокомментирую и дам совет.

С уважением, Константин В. Головченко.