

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Катерина

Возраст: 53

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.04.2006 06:11:57

формирования заключения врача: 09.04.2006 19:47:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/16558/answer/16559>



Заключение врача

Уважаемая Катерина! Дело в том, что длительно существующее недержание мочи, скорее всего, связано с опущением передней стенки влагалища. Это могло возникнуть после тяжелых родов, разрывов, оперативных вмешательств и другой патологии. Недержание мочи неразрывно связано с хроническим циститом. Опущение передней стенки влагалища ведет к растяжению сфинктеров мочевого пузыря, возникает недержание мочи. Зияние или неполное смыкание сфинктеров ведет к проникновению в мочевой пузырь инфекции, и, следовательно, к хроническому воспалению мочевого пузыря (цистит). Первично воспаление мочевого пузыря не было связано с опущением влагалища, не было анатомической предпосылки для прогрессирования цистита. После воздействия этиологических факторов возникла слабость мышц тазового дна, и к развитию цистита присоединился уже органический компонент - вероятнее всего, цистоцеле (это опущение мочевого пузыря, что и называется опущением передней стенки влагалища, но в данном случае подчеркивается заинтересованность в процессе мочевыводящей системы). Возможно, в данное время у Вас наблюдается обострение хронического цистита и/или пиелонефрита, поэтому надо обследоваться у уролога (сделать общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; обследоваться на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды; УЗИ почек, мочевого пузыря и другие методы обследования, которые сочтет нужными уролог). Хронический цистит существует у Вас столько времени, сколько существует недержание, и лечить его нужно немедленно, т. к. длительно существующее воспаление может привести к малигнизации (опухолевому перерождению). Вообще, после лечения цистита надо будет заняться лечением гиперактивного мочевого пузыря, который сопутствует заболеваниям мочевого пузыря, и, наконец, опущением гениталий. В настоящее время существует много способов коррекции, но Вам, возможно, предложат оперативное вмешательство. Отказываться не стоит, потому что недержание со временем не вылечится, а будет только прогрессировать. На сегодняшний день самыми подготовленными врачами в этом разделе медицины являются урогинекологи. В России несомненным лидером в урогинекологии является кафедра урологии Московского государственного медицинского стоматологического университета, профессор Пушкарь Дмитрий Юрьевич. Несомненно, самым лучшим решением для Вас будет обращение на эту кафедру. На нашем сайте размещена База Данных урологов, в которой Вы можете найти профессора Пушкарь Д. Ю. и его координаты. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. С уважением!