

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.04.2006 15:49:47

формирования заключения врача: 09.04.2006 21:42:33

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/16568/answer/16569>



Заключение врача

Уважаемый Андрей! После операции, приблизительно до 2-х месяцев, происходит запустевание вен яичка и семенного канатика. В этот период вены еще не спавшиеся, могут быть видны на УЗИ, пальпироваться, определяться в мошонке. Так как запустевают вены, в этот период идет перестройка кровообращения в мошонке, с этим связаны боли, временный дискомфорт в мошонке, заднем проходе, промежности. Также может наблюдаться временное незначительное увеличение яичка в размерах. Но во время операции иногда вместе перевязываются венозные и лимфатические стволы, в результате нарушается отток лимфы от мошонки и её органов. В связи с этим возникает стойкое увеличение яичка, которое, впрочем, сильно не влияет на его функцию. У Вас с момента операции прошло больше 2-х месяцев, поэтому можно думать о неполном прекращении патологического венозного тока. Такое встречается при рассыпном (много вен) типе строения яичковой вены. Но, как Вы понимаете, это невозможно проверить заочно. Боли внизу живота могут быть проявлением не только урологических заболеваний (простатит, цистит и т. д.), но и неурологических (колит, например). Совет один - обратитесь к своему оперирующему урологу. Выздоровливайте.