

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Елена

**Возраст:** 37

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.01.2009 10:53:00

**формирования заключения врача:** 12.01.2009 21:47:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/165849/answer/165850>



## Заключение врача

Здравствуйте, Елена!

Объяснение этому есть: микоплазма - это условно-патогенный микроорганизм. Это значит, что при определенных условиях (ослабление иммунитета, стрессы и т. п.) он может активироваться и вызывать воспаление. В этот момент его несложно выявить. Если Вы проверялись, когда у Вас все было в порядке, то его могли и не выявить. А когда Вы начали жить половую жизнь со своим молодым человеком, то он мог активироваться и передаться ему. Так же верно и обратное: микоплазма могла быть у Вашего молодого человека, но с началом половой жизни с Вами, она активировалась.

Вам следует повторно обследоваться у гинеколога.

С уважением, Константин В. Головченко.