

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татьяна

**Возраст:** 47

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 13.01.2009 16:32:00

**формирования заключения врача:** 13.01.2009 17:03:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/165971/answer/165972>



## Заключение врача

Здравствуйте, Татьяна!

Предположить синдром Фрейли в этой ситуации можно, так как есть характерная клиника и при УЗИ верхняя чашечка левой почки расширена более, чем средняя и нижние (при этом синдроме передняя и задняя ветви верхней сегментарной почечной артерии сдавливают друг друга между другой верхней частью лоханки). Для 100% подтверждения этого диагноза следует выполнить почечную ангиографию. До выполнения этого обследования можно сделать доплерографию сосудов почки и экскреторную урографию.

Прогноз: возможны осложнения синдрома Фрейли - артериальная гипертензия, мочекаменная болезнь.

С уважением, Константин В. Головченко.