

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: максим

Возраст: 44

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.01.2009 15:16:00

формирования заключения врача: 20.01.2009 00:54:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/166387/answer/166388>



Заключение врача

Здравствуйте, Максим!

По Вашему описанию - это мало похоже на сифилис, так как при первичном сифилисе лимфоузлы безболезненны, а шанкр имеет четкие ровные контуры. Вы же пишете, что у пятна контуры нечеткие, а в паху - болезненность. Возможно Вы не совсем точно описываете пятно, тогда, сделайте качественное фото и перешлите мне на почту (gkv@bk.ru). Прокомментирую и дам совет.

Полностью согласен с доктором Симдяновой Наталией: сдайте анализ крови на сифилис методом ИФА. В начальных стадиях сифилиса RPR-реакция может быть отрицательной, а ИФА уже будет положительным. Маленькая ремарка: анализ на сифилис с провокацией не сдают.

С уважением, Константин В. Головченко.