

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Маирна

**Возраст:** 43

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.04.2006 13:18:03

**формирования заключения врача:** 20.04.2006 21:18:45

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/16882/answer/16883>



## Заключение врача

Уважаемая Марина! Парауретральные кисты, как правило, бывают ретенционными и обусловлены облитерацией (закупоркой) выводных протоков желез, располагающихся в слизистой оболочке. Возникновению кист могут способствовать перенесенные воспалительные заболевания (уретриты различного происхождения), травмы и т. д. Кисты чаще всего одиночные, небольших размеров, склонны к увеличению. Симптоматика долгое время может быть стабильной, стертой. При инфицировании кисты возникают признаки острого гнойного воспаления с образованием свища, открывающегося в просвет мочеиспускательного канала или наружу. У женщин кисты чаще всего локализуются около наружного отверстия мочеиспускательного канала. Небольшие кисты удаляют путем вылушивания. Обратному развитию киста, как правило, не подвергается. Если киста не препятствует ведению половой жизни, то никаких противопоказаний к половой жизни нет. Обратитесь к урологу по месту жительства для осмотра. На нашем сайте размещена База Данных урологов, Вы можете найти уролога в Вашем регионе, который Вас проконсультирует по данному вопросу. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта [UroWeb.ru](http://UroWeb.ru). С уважением!