

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Татьяна

Возраст: 40

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.05.2006 03:32:16

формирования заключения врача: 07.05.2006 12:01:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/17236/answer/17237>



Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Цистит – это длительно протекающее заболевание, требующее очень упорного лечения. Это заболевание характеризуется воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря, его шейки (так называемый, шейечный цистит), интерстиция (интерстициальный цистит). Обострение этого заболевания происходит после переохлаждения, после перенесенных простудных заболеваний, стрессов, переутомления, в общем, во всех ситуациях, когда происходит снижение защитных функций организма. Для излечения цистита необходимо выяснить его причину. Вам необходимо обследоваться на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы; сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря. При невыясненном диагнозе – цистоскопия (инструментальный осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря). После получения анализов можно подобрать схему лечения. Основная схема – антибиотики, уросептики, иммуностимулирующие препараты. Обострение, связанное с половым актом, можно объяснить тем, что у Вас имеет место низкое расположение наружного отверстия уретры, т. е. близко к влагалищу. Конечно, я это могу только предполагать. Поэтому во время полового акта происходит заброс микрофлоры из влагалища к уретре, отсюда и возникают дизурические явления. Обычно в этих случаях рекомендуют прием малых доз уросептиков сразу после полового акта. С уважением.