

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ольга

**Возраст:** 54

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.05.2006 23:24:32

**формирования заключения врача:** 10.05.2006 21:36:15

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/17290/answer/17291>



## Заключение врача

Уважаемая Ольга! Вашей бабушке необходимо дообследование на предмет уменьшения суточного количества мочи. Совсем не обязательно в этом «виноват» детрузор. Уменьшение количества мочи может быть связано с сердечно-сосудистой недостаточностью, малым количеством принимаемой жидкости. Для уточнения причины необходимо выполнить хотя бы общий анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, биохимический анализ крови (креатинин, мочеви́на), ЭКГ. Также можно вести учет принимаемой и выделяемой жидкости. Если по результату УЗИ у бабушки будет нарушение эвакуаторной функции мочевого пузыря и большое количество остаточной мочи, то необходимо обратиться к урологу по месту жительства для выписки альфа-адреноблокаторов. В любом случае необходима консультация терапевта или кардиолога. С уважением.