

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Рамазан

Возраст: 45

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.06.2006 10:42:24

формирования заключения врача: 06.06.2006 19:11:08

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/17768/answer/17769>



Заключение врача

Уважаемый Рамазан! Крипторхизм – системное заболевание, одним из проявлений которого является неопущение яичек в мошонку. Это является поводом для подробного эндокринологического обследования пациента. Негативные последствия, к которым приводит крипторхизм – это малигнизация яичка (яичек) и бесплодие. Риск опухолевого перерождения у мужчин с крипторхизмом в 4-10 раз выше, чем у здоровых мужчин. Развитие этих осложнений связано со сроками лечения. Бесплодие встречается у 10% больных с односторонним крипторхизмом, и у 38% с двухсторонним крипторхизмом. Начальные признаки нарушения развития и функции неопустившегося яичка выявляют в возрасте ребенка 6-12 месяцев. Морфологические изменения наблюдаются уже в 1-2 года, атрофию яичек обнаруживают в возрасте 6-7 лет. Поэтому целесообразно начать лечение в возрасте 6 месяцев и завершить к 2 годам. Хирургическое лечение заключается в низведении и фиксации яичка на любом участке пути его миграции без натяжения сосудистого пучка с использованием анатомических резервов брюшинного пространства. Каким методом оперировать в Вашем случае – решать урологу только после осмотра, изучения всех результатов обследований. Заочной такие вопросы не решаются. Удачи!