

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ольга

**Возраст:** 47

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.06.2006 18:27:10

**формирования заключения врача:** 13.06.2006 12:11:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/17850/answer/17851>



## Заключение врача

Уважаемая Ольга! Конечно, это может быть и цистит. Но есть и другие заболевания, например гиперактивный мочевой пузырь, синдром нижних мочевых путей, которые могут быть причиной подобных ощущений. Цистоскопия выполняется при невыясненном диагнозе, это не настолько болезненная процедура, чтобы терпеть симптомы 3 года и оставить диагноз неуточненным. Необходимо дообследование - на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы; общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, урофлоуметрия. После этого можно будет окончательно определиться с дальнейшей тактикой. Выздоровивайте.