

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Галя

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.10.2010 18:21:00

формирования заключения врача: 19.10.2010 00:44:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/186844/answer/186845>



Заключение врача

1. Если Вы желаете увеличить продолжительность полового акта, то можете попробовать метод "стоп-старт", метод "сжатия" или метод "отвлечения мыслей" (подробное описание найдете в любой поисковой системе). Если это не поможет, то можно попробовать презервативы с анестетиками, например, "Марафон". Можно также использовать обычные презервативы, но перед их использованием на кожу наносить крем "Эмла" или любой из гелей: "Лидохлор", "Инстиллагель" или "Луан", или спрей "Лидокаин". В любом случае, необходима регулярная половая жизнь с постоянным партнером, что само по себе ведет к увеличению продолжительности полового акта.
2. Да, нормально.
3. Это относительный фимоз. Необходим очный осмотр для решения вопроса о консервативном или оперативном (обрезание) лечении.