

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Максим

**Возраст:** 35

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.08.2006 21:02:39

**формирования заключения врача:** 09.08.2006 23:29:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/18706/answer/18707>



## Заключение врача

Уважаемый Максим! После операции, приблизительно до 2-х месяцев, происходит запустевание вен яичка и семенного канатика. В этот период вены еще не спавшиеся, могут быть видны на УЗИ, пальпироваться, определяться в мошонке. Так как запустевают вены, в этот период идет перестройка кровообращения в мошонке, с этим связаны боли, временный дискомфорт в мошонке, заднем проходе, промежности. Также может наблюдаться временное незначительное увеличение яичка в размерах. Но во время операции иногда случайно вместе перевязываются венозные и лимфатические стволы, которые имеют очень маленькие, крошечные размеры, в результате нарушается отток лимфы от мошонки и её органов. В связи с этим возникает стойкое увеличение яичка. В этом случае обязательно обратитесь к своему оперирующему урологу. Удачи!