

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: юрий

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 27.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1870/answer/1871>



Заключение врача

Уважаемый Юрий! О какой непроходимости семенного пузырька идет речь? Каким образом установлена (диагносцирована) непроходимость? Дело в том, что установить подобный диагноз (симптом) крайне сложно. Для этого необходимо выполнить очень инвазивный метод исследования - рентгенографию семявыносящего канатика и семенных пузырьков. Это очень редко выполняемая процедура. Наверное, под непроходимостью Вы подразумеваете расширение семенных (семенного) пузырьков выявленное на УЗИ и/или при ректальном осмотре. И такое состояние, как правило, бывает при воспалении семенных пузырьков (везикулит), простаты (простатит), уретры (уретрит). И потому требует консервативного (медикаментозного) лечения. Если все же Вам достоверно установлен такой диагноз (непроходимость), то напишите мне об этом, и я постараюсь Вам помочь советом. Но лечение, все же, необходимо проводить под контролем уролога. Удачи Вам!