

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Юлия

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.01.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 28.01.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1882/answer/1883>



## Заключение врача

Уважаемая Юлия! При часто рецидивирующих циститах иногда требуется назначение длительных курсов антибактериальных препаратов, американцы даже назначают их до 6-12 месяцев. Нолицин относится фторхинолонам (ноर्फлоксацин), он применяется при лечении инфекций мочевыводящих путей. К неграму в настоящее время отношение сдержанное, т. к. у него небольшой спектр действия, а сейчас стараются назначать антибактериальные препараты широкого спектра действия. Далее, не следует забывать о таком осложнении хронического цистита, как гиперактивный мочевой пузырь. Когда нет инфекционного начала, нет как такового воспаления, а дизурические явления (боли, рези, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря) остаются. В таком случае оправдано применение таких препаратов, как дриптан (по 1 таб. 2 раза в день до 30 дней), или спазмекс, или детрузитол по схеме. Все обследование и лечение я рекомендую проводить Вам под контролем уролога, т. к. необходимо вовремя и правильно оценить результаты обследований и при необходимости скорректировать лечение. Удачи!