

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Никита

**Возраст:** 50

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.08.2006 10:29:29

**формирования заключения врача:** 30.08.2006 12:25:32

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/19004/answer/19005>



## Заключение врача

Уважаемый Никита! Гарднереллез передается половым путем, поэтому лечение назначается обоим половым партнерам. Для выяснения причины снижения подвижности сперматозоидов необходимо обследовать - на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1,2), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, секрет простаты, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), гормональный фон, визуальный осмотр (на предмет варикоцеле). Это минимальный спектр обследования, который может быть расширен в зависимости от результатов предыдущих обследований. Девушка также должна обследоваться у гинеколога. Для решения всех этих вопросов Вам необходимо обратиться в Центр планирования семьи (или Центр репродукции), где профессионально занимаются подобными вопросами. Выждать время для зачатия не надо. С уважением.