

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ирина

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 31.01.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 31.01.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1928/answer/1929>



## Заключение врача

Уважаемая Ирина! Вторично сморщенная почка – это результат протекания хронического воспалительного процесса в почке на фоне нарушения мочеоттока. Ее отличие от нормальной, как Вы уже поняли, состоит в уменьшении размеров. Но размеры при вторично сморщенной почке уменьшены за счет истончения паренхимы (т. е. функционально активной части почки). Контур почки становится бугристым, толщина паренхимы резко уменьшена, а чашечно-лоханочная система имеет обычную форму и размеры. Что касается подвздошной дистопии, то это аномалия расположения почки, при которой почка расположена в подвздошной ямке. Вам в любом случае нужно дождаться проведения обследования, т. к. необходим точный диагноз. К сожалению, консервативных методов лечения вторично сморщенной почки не существует, т. к. процесс нефросклероза (сморщивания) необратим, единственное, его можно приостановить, проводя противовоспалительное лечение. Что касается применения чудодейственного кедрового масла, что я не знаком с его действием, и у меня нет данных по его применению при вторично сморщенной почке, не думаю, что оно Вам поможет. Повторю, что Вашей бабушке может помочь только регулярное наблюдение у уролога по месту жительства и при необходимости проведение противовоспалительной терапии. С уважением.