

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 31.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1928/answer/1929>



Заключение врача

Уважаемая Ирина! Вторично сморщенная почка – это результат протекания хронического воспалительного процесса в почке на фоне нарушения мочеоттока. Ее отличие от нормальной, как Вы уже поняли, состоит в уменьшении размеров. Но размеры при вторично сморщенной почке уменьшены за счет истончения паренхимы (т. е. функционально активной части почки). Контур почки становится бугристым, толщина паренхимы резко уменьшена, а чашечно-лоханочная система имеет обычную форму и размеры. Что касается подвздошной дистопии, то это аномалия расположения почки, при которой почка расположена в подвздошной ямке. Вам в любом случае нужно дождаться проведения обследования, т. к. необходим точный диагноз. К сожалению, консервативных методов лечения вторично сморщенной почки не существует, т. к. процесс нефросклероза (сморщивания) необратим, единственное, его можно приостановить, проводя противовоспалительное лечение. Что касается применения чудодейственного кедрового масла, что я не знаком с его действием, и у меня нет данных по его применению при вторично сморщенной почке, не думаю, что оно Вам поможет. Повторю, что Вашей бабушке может помочь только регулярное наблюдение у уролога по месту жительства и при необходимости проведение противовоспалительной терапии. С уважением.