

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** мария

**Возраст:** 41

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.12.2010 15:33:17

**формирования заключения врача:** 13.12.2010 18:54:32

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/195935/answer/196087>



## Заключение врача

Если есть расширение ЧЛС, снижение диуреза и нарастание уремии, надо в первую очередь исключить повреждение устья мочеточника с возможной перфорацией в брюшную полость. Сделайте как минимум: УЗИ органов брюшной полости на предмет наличия жидкости. Сделайте восходящую цистограмму. Если нет свободной жидкости( особенно обратить внимание на запузырное пространство,можно - ректальным датчиком) и затёка - повреждения брюшины нет, что не исключает повреждения мочеточника. Тогда должна нарастать пиелозктазия. Однако, если уже нарастает уремия , то диурез снизился и пиелозктазия нарастать не будет. Тогда надо решать вопрос о гемодиализе.А неврологически больной ухудшается на фоне уремии и нарастающего отёка мозга. Сочувствую.