

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ирина

**Возраст:** 46

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.10.2006 21:02:28

**формирования заключения врача:** 16.10.2006 12:59:44

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/19672/answer/19673>



## Заключение врача

Уважаемая Ирина! Хронический пиелонефрит - хроническое заболевание чашечно-лоханочной системы почек. Он бывает первичным (возникает в здоровой почке) - наблюдаются чаще у женщин, что связано с анатомическими особенностями. Вторичный пиелонефрит может осложнить любое урологическое заболевание или аномалию развития почки. При мочекаменной болезни пиелонефрит встречается у 95-98% больных. Причиной является инфекция - патогенные бактерии, вирусы, реже - микроскопические грибы. В настоящее время наблюдается возникновение новых, более устойчивых форм бактерий и вирусов, что затрудняет лечение. На возникновение и течение пиелонефритов значительно влияют механизм развития. Ведущим фактором является иммунологический, а для больных вторичными пиелонефритами - и нарушение оттока мочи. Уточните следующие моменты: Вы обследовались на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, микоплазмы, уреаплазмы, гарнереллы, кандиды)? Вы делали посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам? Эти обследования обязательны для лечения обострения пиелонефрита и продления ремиссии. С уважением.