

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** ольга

**Возраст:** 47

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.10.2006 15:11:24

**формирования заключения врача:** 23.10.2006 09:47:34

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/19716/answer/19717>



## Заключение врача

Уважаемая Ольга! Виртуально нельзя решить - какой метод предпочтительнее в Вашем случае. Для этого необходимо визуально оценить рентгеновские снимки, результаты УЗИ, результаты анализов, провести осмотр. Камни лоханки, если они вызывают резкое нарушение мочеоттока (о чем свидетельствует почечная колика), необходимо удалять. Размеры Вашего камня достаточно крупные, поэтому подвергать его дистанционному дроблению нецелесообразно. Методом выбора в Вашем случае может быть нефролитолапаксия - чрезкожное дробление и удаление фрагментов камня, либо открытая операция (пиелолитотомия). Камень таких размеров сам не отойдет, никакими консервативными методами его «растворить» нельзя. В дальнейшем камень будет расти, а функция почки снижаться. Поэтому я бы рекомендовала камень все же удалить. Какой метод операции выбрать - это надо решать Вашим урологам, заочно такие вопросы решить невозможно. Пишите, буду рада помочь.