

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 39

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.10.2006 23:19:58

формирования заключения врача: 25.10.2006 11:36:48

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/19846/answer/19847>



Заключение врача

Уважаемая Екатерина! Причиной гидронефроза в детском возрасте чаще всего может быть пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР). Это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи). Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая (1-2), иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях (1-2 степень) рефлюкс самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая (3), и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение - антирефлюксная операция. Пока необходимо соблюдать диету (исключить острое, соленое), давать ребенку отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца по 1 ст. л. 3 раза в день). Также причинами гидронефроза могут быть различные аномалии развития - врожденный гидронефроз, стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента и др. Не переживайте, в Свердловской области очень хорошие урологи, уверена, что все будет нормально. С уважением.