

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.01.2011 12:35:22

формирования заключения врача: 02.01.2011 22:14:35

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/199677/answer/199767>



Заключение врача

Здравствуйте, Евгений. 1) После каждого семяизвержения и оргазма наступает период, так называемой, детумесценции, то есть спада эрекции и невозможности её достичь. Этот период очень индивидуален и может длиться от 1-2 минут до 1-2 часов. Если в данный период попытаться достичь эрекции, то переживания связанные с невозможностью её достижения (что нормально в этот период), только усугубят ситуацию. Так что в следующий раз попробуйте сделать небольшой перерыв перед повторным половым актом. 2) Объективно варикоцеле может быть установлено при УЗИ органов мошонки в доплеровском режиме. Если при УЗИ есть признаки патологического обратного кровотока и, если при этом есть боли в мошонке, нарушения в спермограмме, то это является показанием к операции. Операция занимает не более 20 минут и проводится под местной анестезией. Всего наилучшего.