

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталья

Возраст: 39

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.11.2006 10:41:06

формирования заключения врача: 07.11.2006 14:15:59

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/20044/answer/20045>



Заключение врача

Уважаемая Наталья! 1. Метронидазола для лечения уреаплазм и кондилом недостаточно. 2. Правильно, что будете лечиться оба. 3. Кондиломы необходимо удалять, т. к. они тоже передаются половым путем и есть риск заражения партнера. Удаление кондилом снижает этот риск. 4. Еще одна причина их удалять - остроконечные кондиломы обусловлены инфекцией - человеческим вирусом папилломы, их еще называют венерическими или генитальными бородавками. Кондиломы рассматриваются как предраковое заболевание полового члена у мужчин. У женщин вирус папилломы человека считается одним из этиологических факторов рака шейки матки и дисплазии. 5. Если кондиломы находятся на наружных половых органах, то удаление никак на Вас не повлияет. С уважением.