

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Николай Семенович

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 05.02.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/2012/answer/2013>



Заключение врача

Уважаемый Николай Семенович! Из вашего вопроса не совсем понятно, откуда подтекает моча – из эпицистостомического свища или из мочеиспускательного канала, это имеет принципиальное значение. Если подтекает из свища, то еще прошло немного времени, он закроется и моча не будет подтекать. Если из мочеиспускательного канала, то это бывает после аденомэктомии. В этой ситуации Вам можно рекомендовать тренировать мышцы, удерживающие мочу, т. е. стараться на некоторое время задержать мочеиспускание. Чаще всего, со временем эта проблема решается. Если все-таки недержание будет продолжаться, то можно использовать такие препараты, как детрузитол, спазмекс, дриптан (или/или) по 1 таблетке 2 раза в день. Пишите, если будут еще вопросы. С уважением.