

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алина

Возраст: 53

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.11.2006 13:58:14

формирования заключения врача: 16.11.2006 16:37:05

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/20212/answer/20213>



Заключение врача

Уважаемая Алина! Кисты, как правило, бывают ретенционными и обусловлены облитерацией (закупоркой) выводных протоков желез, располагающихся в слизистой оболочке. Возникновению кист могут способствовать перенесенные воспалительные заболевания (уретриты различного происхождения), травмы и т. д. Кисты чаще всего одиночные, небольших размеров, склонны к увеличению. Симптоматика долгое время может быть стабильной, стертой, как у Вас. При инфицировании кисты возникают признаки острого гнойного воспаления с образованием свища, открывающегося в просвет мочеиспускательного канала или наружу. У женщин кисты чаще всего локализуются около наружного отверстия мочеиспускательного канала. Небольшие кисты удаляют путем вылуцивания. Трудно сказать, есть ли риск откладывания оперативного вмешательства, т. к. киста у Вас существует более 12 лет. Если будете удалять, обязательно необходимо выполнить гистологическое исследование. С уважением.