

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ирина

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.02.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 05.02.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/2026/answer/2027>



## Заключение врача

Уважаемая Ирина! Действительно, если почка не функционирует, то предпочтительнее ее удалить. Но, учитывая возраст Вашей бабушки, отсутствие обострений пиелонефрита, отсутствие нарастания шлаков (продуктов азотистого обмена) в крови, от операции можно пока воздержаться. Если будет нарастать почечная недостаточность, будут высокими показатели креатинина, мочевины и остаточного азота в крови, то тогда операция будет проводиться по жизненным показаниям. Нефункционирующая почка налагает определенные обязательства на другую почку, которая вынуждена выполнять на двойную нагрузку. Ваша задача состоит в том, чтобы периодически делать анализы: общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря, анализ крови (общий, на сахар), биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, остаточный азот, общий белок, АЛТ, АСТ) и наблюдаться у уролога. Это нужно для того, чтобы не пропустить возможное воспаление (пиелонефрит) единственной функционирующей почки. Далее. Вы совершенно правы, леспефлан (леспенефрил) – спиртовой раствор бобового растения леспедезы головчатой. Но для пациентов, которые по каким-то причинам не могут переносить спиртовые растворы, выпускается лиофилизированный экстракт для инъекций. Вводится внутривенно (растворять в изотоническом растворе хлорида натрия) или внутримышечно (в среднем по 3-4 ампулы в день). Из противоазотемических средств можно применять хофитол – очищенный экстракт растения цинара сколимус, выпускается в ампулах по 5-10мл. Применяется внутривенно или внутримышечно, курс лечения – 12 инъекций. Также при хронической почечной недостаточности (какая имеет место у Вашей бабушки, т. к. одна почка не функционирует) применяют энтеросорбенты – вещества, которые адсорбируют на себе аммиак и другие токсичные вещества в кишечнике. Другими словами, это различные виды активированного угля для приема внутрь (полифепан, энтеросорб, энтеродез и др.). Что касается режима, то это ограничение тяжелого физического труда, переохлаждения, перегревания, простудных заболеваний, своевременное лечение сопутствующей патологии (сердечно-сосудистой, коррекция артериального давления), соблюдение диеты (ограничение соли до 10г/сут, уменьшение потребления белка в пищу, исключение острых и пряных блюд и приправ, алкоголя). Пишите. если еще понадобится наша помощь. С уважением.