

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марианна

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 06.02.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/2044/answer/2045>



Заключение врача

Уважаемая Марианна! Не совсем понятно, Вы делали после лечения контрольный анализ на папилломовирус и хламидии? Дело в том, что цистит может быть вызван именно урогенитальной инфекцией, к которой относятся эти виды возбудителей. Ваша тактика сейчас должна заключаться в том, что надо выяснить вылечились ли Вы от папилломовируса и хламидий, сделать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Если результат обследования покажет наличие инфекции, то надо провести курс противовоспалительной терапии. В настоящее время классическая картина любого заболевания не всегда является «классической», поэтому не всегда при цистите бывают боли и рези во время мочеиспускания. Часто, но не всегда. Уретроскопию делают как женщинам, так и мужчинам. Также не следует забывать о таком осложнении длительно текущего хронического цистита, как гиперактивный мочевой пузырь. Когда нет инфекционного начала, нет как такового воспаления, а дизурические явления (боли, рези, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря) остаются. В таком случае оправдано применение таких препаратов, как дриптан (по 1 таб. 2 раза в день до 30 дней), или спазмекс, или детрузитол по схеме. В ряде случаев хронический цистит протекает латентно, при этом наблюдаются нормальные анализы мочи, отсутствие возбудителя при бакпосевах. Инструментальные методы обследований (УЗИ и цистоскопия) также не дают подтверждения этого диагноза. Возможно, что в таком случае речь идет о цисталгии – это боли или чувство дискомфорта над лобком, боли и дискомфорт при мочеиспускании при нормальной моче. Это заболевание также называют неврозом мочевого пузыря, он встречается только у женщин. Причина неизвестна. Ясно, что жалобы появляются при гормональных нарушениях и в большинстве случаев зависят от расстройств кровообращения в области треугольника Льео и шейки мочевого пузыря в связи с местными патологическими процессами в окружающих органах, первое место среди которых принадлежит гениталиям. Как правило, при сопоставлении жалоб больной с результатами обследований, можно говорить о наличии данной патологии (моча нормальная, при цистоскопии изменений на слизистой оболочке не наблюдается, только лишь изменения в области треугольника). Обязательно должны быть обследованы гениталии. Рациональное лечение цисталгии заключается в устранении заболеваний женской половой сферы. Пишите, если будут еще вопросы. Выздоровливайте!