

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Артур

**Возраст:** 40

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.12.2006 17:23:54

**формирования заключения врача:** 06.12.2006 07:46:29

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/20612/answer/20613>



## Заключение врача

Уважаемый Артур! То, что Вы описываете – это нормально. Такие симптомы часто встречаются при неоконченном половом акте, т.е. когда половой акт не заканчивается эякуляцией (выбрасыванием семени). При нереализованной эякуляции развивается венозное полнокровие предстательной железы, возможно возникновение застойного простатита, который характеризуется ноющими болями после полового акта, иррадирующими в мошонку, паховую область. Боли усиливаются при намеренном пролонгировании полового акта, при дизритмиях половой жизни. Рекомендовать можно регулярную половую жизнь, без излишеств, без необоснованных воздержаний. Желательно, чтобы половой акт заканчивался эякуляцией. Удачи!